

Datum waarop Natriumoxybaat voor het eerst is voorgeschreven:

.....

CONTACT INFORMATIE

Naam van patiënt

Telefoonnummer van patiënt

Naam van naast familielid

Naam van behandelend arts

Telefoonnummer van behandelend arts

Telefoonnummer bij medische nood

Aanvullende informatie betreffende natriumoxybaat is beschikbaar in de samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op <http://www.cbg-meb.nl>

U kunt extra materiaal opvragen bij AS Kalceks, e-mail: pharmacovigilance@kalceks.lv

Deze kaart is online beschikbaar op <https://kalceks.lv/en/educational-materials/>

Patientenkaart v1, 04/2020.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR ARTSEN EN APOTHEKERS

Natriumoxybaat 500 mg/ml

Deze patiënt gebruikt Natriumoxybaat als behandeling voor narcolepsie met kataplexie.

- Natriumoxybaat kan ademhalings- en CZS depressie, epileptische aanvallen, psychotische gebeurtenissen, depressie en suïcidaliteit veroorzaken.
- Alcohol mag niet gebruikt worden tijdens de behandeling met Natriumoxybaat.
- Opioiden en barbituraten mogen niet gelijktijdig met Natriumoxybaat worden gebruikt. Het gebruik van andere adem-halings- en CZS- onderdrukkende middelen moet worden vermeden. Wees extra voorzichtig met het gebruik van topiramaat en valproaat gelijktijdig met Natriumoxybaat.
- Natriumoxybaat kan misbruik/oneigenlijk gebruik/afhankelijkheid veroorzaken.
- Let op: Er zijn ook andere dranken met natriumoxybaat in de handel. Elke drank moet op zijn eigen manier klaargemaakt worden. Wijs de patiënt erop hoe dit middel gebruikt moet worden. Gebruik alleen de spuit die in de verpakking bij het middel zit.
- Raadpleeg de samenvatting van de productkenmerken van Natriumoxybaat voordat u deze patiënt andere geneesmiddelen voorschrijft of verstrekt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR PATIËNTEN

DOEN

- Zoek direct medische hulp na een te hoge inname van Natriumoxybaat
- Draag deze kaart altijd bij u
- Laat de kaart zien aan elke arts of apotheker die bij uw behandeling betrokken is
- Neem bij een bezoek aan uw arts of apotheker een lijst mee van alle medicatie die u gebruikt
- Als u ongewone symptomen ervaart tijdens het gebruik van Natriumoxybaat, zoals gewelddadige gedachten waaronder gedachten om anderen pijn te doen, informeer dan onmiddellijk uw arts
- Bewaar Natriumoxybaat buiten bereik van kinderen
- Let op: Er zijn ook andere dranken met natriumoxybaat. Elke drank moet op zijn eigen manier klaargemaakt worden. Lees daarom heel goed hoe u dit middel moet gebruiken. Neem contact op met uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoe u dit middel moet gebruiken. Gebruik alleen de spuit die in de verpakking bij het middel zit.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Natriumoxybaat kan de ademhaling onderdrukken en het bewustzijn verlagen.

NIET DOEN:

- Gebruik **GEEN** alcohol terwijl u wordt behandeld met Natriumoxybaat
- Gebruik **NIET** meer dan de dosis die uw arts heeft voorgeschreven
- U mag **NIET** autorijden of machines bedienen binnen 6 uur nadat u Natriumoxybaat hebt gebruikt
- Gebruik **GEEN** andere medicijnen, tenzij u dit met uw arts hebt besproken
- U mag Natriumoxybaat **NIET** met anderen delen

Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico's van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen en zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb op www.lareb.nl.